

Seudorin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Seudorin 秀得寧錠 鹽酸假麻黃鹼	Pseudoephedrine	30 mg/tab

【作用】

治鼻塞、支氣管擴張

【用法和用量】

通常一天1粒至3粒，分次服用。

【注意事項】

1. 如果您對該藥過敏，請告訴醫師或藥師。
2. 如果您有高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺異常、前列腺肥大造成的排尿困難，請告訴醫師。
3. 打算懷孕、已懷孕、哺乳，應告訴醫師 **【不良反應】**

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、嘔吐、發汗、排尿困難、心悸、目眩、失眠、顫抖、神經過敏	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
心搏過速、血壓過高	請停藥，並立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

萬一您錯過服藥時間或者忘記服藥，請儘快服用。如果下一次的服藥時間快要到了，應跳過您漏服的藥物，等下次服藥時間到了，再依正常劑量服用。切勿因為之前漏服而增加服藥劑量。

【藥物儲存和處理方法】

1. 請將藥物儲存在加蓋容器中並置於室溫下。避免高溫、潮濕及陽光直射。
2. 治療結束之後，請詢問您的藥劑師、醫師或醫護人員如何妥善處理剩下的藥物。此外，您也必須丟棄過期的藥物。
3. 請將藥物存放在兒童構不到的地方。切勿與任何人共用您的藥物。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)