

## Pyrazinamide 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Pyrazinamide (PZA) 敵癆新邁錠	Pyrazinamide	500 mg/tab

### 【作用】

抗肺結核。

### 【用法和用量】

- 1、每日使用 1 次，或者是一星期 2 次。
- 2、請遵照醫師指示服用，不可私自停藥或增減藥量。

### 【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：  
Zyloprim、Col-Probenecid、Benemid、Trecator-SC、Vitamins.
- 3、若您曾患有腎臟、肝臟方面的疾病、痛風或糖尿病，請告訴醫生。
- 4、應避免長時間曝曬於太陽下，平時應做好防曬措施：防護衣、太陽眼鏡、遮光劑等物品，此藥可能會使您的皮膚對光敏感。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃、疲勞。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮疹、發燒、嘔吐、沒有胃口、皮膚或眼睛泛黃、暗色的尿、關節腫痛、異常的出血或瘀血、排尿困難。	請立即就醫


### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)