

Xarelto 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Xarelto F.C.T 10 mg 拜瑞妥 膜衣錠	Rivaroxaban	10 mg/fct
Xarelto F.C.T 15 mg 拜瑞妥 膜衣錠	Rivaroxaban	15 mg/fct

【作用】

用於靜脈血栓高危險群（曾發生有症狀之靜脈血栓症，如心衰竭、高血壓、糖尿病、 ≥ 75 歲、曾發生腦中風或短暫性腦缺血發作）病患，及非瓣膜性心房纖維顫動病患

【用法和用量】

1. 靜脈血栓高危險：口服，隨餐服用。接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，每天限用 10 mg。
人工髖關節手術術後，最多 5 週；人工膝關節手術術後，最多 2 週。
2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患：Clcr > 50 mL/min：每天 1 次 15~20 mg 錠；
Clcr 30~50 mL/min：每天 1 次 10~15 mg 錠。於晚餐時服用。
最大劑量為 20 mg
3. < 18 歲以下孩童及青少年無臨床資料，不建議使用。
4. > 65 歲老年人不用調整劑量。

【注意事項】

1. 對 rivaroxaban 過敏者、嚴重進行性出血病患（如：顱內出血、胃腸道出血）、與凝血異常有關會導致臨床相關出血風險的肝病者及嚴重腎功能受損病患（Clcr < 30 mL/min），禁止使用本藥品。
2. 動物資料顯示會分泌至乳汁中，不建議哺乳期間使用本品。
3. 無孕婦使用本品安全性與有效性的資料。
4. 本品會增加出血風險，請小心監測，追蹤血紅素。
5. 使用 azole 類抗黴菌藥（ketoconazole...）或蛋白酶抑制劑（ritonavir）... 等 CYP3A4 和 P-gp 抑制劑，會增加本品的血中濃度而可能增加出血的風險。

【不良反應】

服用本藥時，可能發生的副作用：噁心、發燒、四肢水腫、術後出血、丙氨酸轉氨酶（GGT; γ GT）及轉氨酶升高。


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)