

Viagra 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Viagra 威而鋼 錠	Sildenafil	100 mg/tab

【作用】

改善性功能

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日最大建議劑量 100 mg。
- 3、可與食物服用或單獨不和食物併服，與高脂類食物混用，則會加長開始作用的時間。

【注意事項】

- 1、會促進有機硝酸鹽類的降壓作用，所以任何形式（口服、注射、吸入或貼片）之硝酸鹽類都不適合與其併用。
- 2、禁止使用於因心血管危險因子而不適合進行性行為之患者。
- 3、嚴重肝腎功能不全、低血壓（血壓低於 90-50 mmHg）、遺傳退化性視網膜病變（如色素性視網膜炎）、最近曾有中風或心肌梗塞之患者，除有特殊之原因，禁止使用此藥。
- 4、陰莖勃起超過 4 小時應馬上尋求醫療上的協助，如未馬上治療可能導致陰莖組織的永久損傷及永久喪失其能力。
- 5、此藥為成年男性勃起功能障礙，目前並不適用於女性與小孩。（若有其他用途，請詢問醫師或藥師）。
- 6、告訴醫生和藥師您在使用什麼處方或非處方藥、維生素、營養食品，特別是甲型阻斷劑。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼、反胃、腹瀉、頭暈或頭昏、熱潮紅、鼻塞。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
視覺突然減退、視線模糊、顏色辨識能力變差（難以辨識藍色或綠色）、勃起疼痛、長時間勃起（大於 4 小時）、昏倒、胸口痛、排尿時搔癢及灼熱感、紅疹。	立即就醫

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。