

## Urief 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Urief 優列扶膠囊	Silodosin	4mg/cap

### 【作用】

前列腺肥大（增生）所伴隨的排尿障礙。

### 【用法和用量】

1. 通常一天 1-2 次，飯後服用。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。
3. 初次服用建議睡前，因為這樣可減輕姿勢性低血壓與暈眩等副作用，及有效改善夜間頻尿現象。

### 【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是 ketoconazole, clarithromycin, itraconazole, ritonavir 等因為有許多藥會影響本藥之藥效。
2. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
3. 若您曾患有前列腺癌或肝、腎、低血壓方面的疾病，請告訴醫師。
4. 如果您計劃進行眼科手術，請事先告知您的醫師，您正服用本藥。
5. 當您第一次使用此藥或增加藥量，還是已停藥數日重新接受療程時必須瞭解的情況：橫臥突然爬起會有頭暈、頭昏、或昏倒的狀況。避免發生危險，您應慢慢下床，於床邊休息一會再緩緩站起。症狀沒改善請告訴醫師。

### 【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
口乾、便秘、腹瀉、頻尿、頭痛、胃部不適、姿勢性低血壓、頭昏、眩暈、搖晃感、背痛、關節痛、鼻炎等	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
過敏症狀如皮膚癢或蕁麻疹、臉或手部腫、嘴部或喉嚨腫或感到刺痛、胸悶、呼吸困難、意識喪失等或其他症狀如心跳不規則等	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：頭暈、昏倒、視線模糊、反胃、頭疼。

### 【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

## 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)