

Singulair 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Singulair 欣流 咀嚼錠 4 公絲	Montelukast	4 mg/tab
Singulair OG 4 公絲/包 欣流 顆粒劑	Montelukast	4 mg/包
Singulair 欣流 咀嚼錠 5 公絲	Montelukast	5 mg/tab
Singulair 欣流 咀嚼錠 10 公絲	Montelukast	10 mg/tab

【作用】

氣喘

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日使用一次，通常於晚上服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如果您曾經患有苯酮尿症或肝病請告訴您的醫生。
- 3、此藥用於控制病情，但無法治癒；當您感覺病情好轉請繼續用藥，勿私自停藥或增減藥量。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼、頭暈、胃灼熱、反胃、疲倦、胃痛、牙痛、鼻塞、咳嗽。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸困難、嚴重的紅疹、發燒、如感冒一般的症狀。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。