

Januvia 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Januvia 糖漸平 膜衣錠	Sitagliptin	100 mg/fct

【作用】

降血糖，治療第 2 型糖尿病。

【用法和用量】

- 1、成人：一天一次，一次一粒。飯前或與食物並服均可。
- 2、兒童：<18 歲，安全性及有效性尚未建立。
- 3、①中度腎功能不良者 (Clcr \geq 30~<50 mL/min)：一天一次，一次半粒。
②重度腎功能不良或洗腎患者 (Clcr<30 mL/min)：一天一次，一次 1/4 粒。

【注意事項】

- 1、服藥發生任何過敏反應，請告訴醫師或藥師。
- 2、服藥前請告訴醫師或藥師你的病史，尤其是腎臟病、胰臟疾病。
- 3、酒精可能會降低血糖，應避免喝酒，並遵循醫師或營養師的建議，進行運動或飲食。
- 4、你可能經歷極高或極低血糖所產生的複視、眩暈、昏睡。請勿開車、操作機械或需要集中注意力的工作。
- 5、當身體有壓力時（發燒、感染、受傷、開刀）很難控制血糖，應與醫師討論是否改變治療計劃、藥物或血糖檢查。
- 6、開刀前應告訴醫師或牙醫師有關你所服用的處方藥、非處方藥、草藥
- 7、懷孕時會惡化糖尿病，應與醫師討論如何管理血糖及不同治療（飲食、運動、藥物）的優缺點。
- 8、若有血糖過低症狀，趕緊先吃含糖的食物（如柳橙汁、蜂蜜、砂糖、糖果）
- 9、與已知可引發低血糖的藥物併用，如胰島素促分泌物質（磺醯尿素類），可能引發低血糖症，可能需要降低胰島素促分泌物質的劑量。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
顫抖、眩暈或輕微頭痛、冒汗、神經質或激動、行為或情緒突然改變、嘴邊發麻及刺痛、虛弱、皮膚蒼白、飢餓、動作不靈活。	監測血糖、趕緊先吃含糖的食物（如柳橙汁、蜂蜜、砂糖、糖果）
如果您有任何①過敏反應：蕁麻疹、呼吸困難的徵兆，臉、嘴唇、舌頭或咽喉腫脹。②胰臟炎：重度疼痛，從你的胃上部蔓延到你的背部，噁心，嘔吐，食慾不振，心臟速度快③發燒，喉嚨痛，頭痛伴隨嚴重起泡、脫皮、紅色皮疹。	請家屬或朋友立即送至醫院治療

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，室溫、避光、避熱、防潮，且不容易被小孩拿到的地方。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)

財團法人天主教若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)