

Aldactin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Aldactin 愛達信 錠	Spironolactone	25mg/tab

【作用】

1. 本藥為一種利尿劑，用於治療高血壓及心臟病或其他情況引起的體液滯留。
2. 本藥也用於治療醛固酮過高症及低血鉀的病人。

【用法和用量】

1. 通常一日一次，早上服用，或一日二次，早餐及午餐服用。
2. 控制高血壓，必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 如果您對該藥過敏，請告訴醫師或藥師。
2. 如果在服用其他藥，包括：aspirin, captopril, digoxin, lithium，用於關節炎、糖尿病、高血壓用藥、鉀補充劑及維他命等，請告訴醫師。
3. 如果您有或曾經有糖尿病、痛風、腎及肝臟等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您打算開刀（包括牙齒）、懷孕、已懷孕、哺乳，請告訴醫師。
5. 遵守醫師指示，低鹽、低鈉的飲食，避免含鉀的代鹽，減少服用富含鉀的食物(例如：香蕉、李子乾、葡萄乾及柳橙汁)。

【可能出現的副作用】

服藥後頻尿最少可能持續 6 小時，可能幾星期之後才會減少頻尿。

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
胃部不適、嘔吐、腹瀉、胃痛、多尿、頭暈、乳房脹大、月經不規則、嗜睡等	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
無力、體重快速減輕、疲勞、心跳減慢或不規則、喉嚨痛、不正常的瘀青或出血、皮膚或眼睛泛黃、吐血、發燒、意識不清等	並立即告知醫生

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)