

Salazine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Salazine 撒樂腸溶錠	Sulfasalazine	500 mg/ect

【作用】

控制腸部發炎狀況、類風濕性關節炎

【用法和用量】

- 1、與食物併服可減少對胃腸的刺激性。
- 2、最好與大量開水併服，可減少副作用。
- 3、請整粒吞服，不可嚼碎或剝半。
- 4、除非醫師指示，切勿給兩歲以下小孩服用。

【注意事項】

用藥前須知：

- 1、有蠶豆症者不可服用。
- 2、對磺胺藥過敏者不可服用。
- 3、肝腎功能不良者，須小心服用。

使用中注意：

- 1、服用此藥後某些人會對光較敏感，請盡量不要曝曬於陽光下。
- 2、手術前請通知你的醫師你正服用此藥。
- 3、尿液或皮膚有時會呈橘黃色。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
腹瀉、嘔吐、頭痛、胃口不好、胃痛、腸胃不適	將情況告訴醫生
紅疹、蕁麻疹、紅腫、喉嚨疼痛、發燒、疲倦、虛弱、關節或肌肉疼痛、皮膚蒼白或泛黃、吞咽困難、異常出血。	立即通知醫生並停止用藥。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)