

Sulfonylurea 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Gliben 固利康錠	Glibenclamide	5 mg/tab
Diamicon MR 岱蜜克龍 持續錠	Gliclazide	30 mg/tab
Glusafe 糖安錠	Glimepiride	2 mg/tab

【作用】

降血糖（治療非胰島素依賴型糖尿病，型 2）

【用法和用量】

- 1、通常一日 1~3 次，飯前 30 分鐘服用。
- 2、不可擅自停藥或增減劑量。

【注意事項】

- 1、酒精可能會降低血糖，應避免喝酒，並遵循醫師或營養師的建議，進行運動或飲食。
- 2、接受任何手術或急救治療（包括牙齒），請告知醫師。
- 3、一定要定期檢查血糖。
- 4、若有血糖過低症狀，趕緊先吃含糖的食物（如柳橙汁、蜂蜜、砂糖、糖果）
- 5、若有肝、腎、心臟病、甲狀腺疾病或嚴重感染，請告訴醫生。
- 6、如已懷孕或想懷孕、哺乳、服用其他藥物，應告訴醫師

註：高血糖症狀：1、極度口渴 2、極度饑餓 3、頻尿 4、視力模糊 5、虛弱
若發生呼吸急促、反胃、嘔吐、意識降低，請立即就醫。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
顫抖、眩暈或輕微頭痛、冒汗、神經質或激動、行為或情緒突然改變、嘴邊發麻及刺痛、虛弱、皮膚蒼白、飢餓、動作不靈活。	監測血糖、趕緊先吃含糖的食物（如柳橙汁、蜂蜜、砂糖、糖果）
混亂、意識喪失、抽搐	請家屬或朋友送至醫院治療

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，室溫、避光、避熱、防潮，且不容易被小孩拿到的地方。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。