

Unasyn 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Unasyn 優耐迅	Ampicillin /Sultamicillin (A/S=225/150)	375 mg/tab

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日服用 2 至 3 次。

【注意事項】

- 1、療程結束前勿擅自停藥，突然停藥會使得細菌產生抗藥性。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物(抗生素、Allopurinol、抗凝血劑、Atenolol、口服避孕藥、Probenecid、Rifampin、Sulfasalazine、維生素)或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您曾患有哮喘、花粉症、腎臟或食道疾病(特別是結腸炎)，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；發癢；發燒；冷顫；臉部腫脹；喘息；呼吸困難；異常的出血或瘀血；頭暈；抽搐；嘴或喉嚨疼痛。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)