

Tamsulosin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Tamlosin 暢利淨 膠囊	Tamsulosin	0.2 mg/cap
Harnalidge OCAS 活路利淨 持續性藥效膜衣錠	Tamsulosin prolonged release	0.4mg/tab

【作用】

前列腺肥大（增生）所伴隨的排尿障礙

【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 每日一次，於飯後 30 分鐘使用，請於固定時間服用。
3. 使用時注意需整粒吞服，不可咀嚼、打開或破壞。
4. 醫師會給較低的起始劑量，2 至 4 週後可能會增加藥量。

【注意事項】

- 1、此藥用於控制病症但無法治癒，療效在療程開始幾星期後見效，病情好轉請持續服藥不可私自停藥或增減藥量。
- 2、服用本藥前，如有服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師。
- 3、此藥男性患者所用，不應用於女性，特別是懷孕或哺乳期間。
- 4、若您曾患有前列腺癌或肝、腎方面的疾病，請告訴醫師。
- 5、於開刀前(包括牙齒)告訴醫師您在使用此藥。
- 6、當您第一次使用此藥或增加藥量，還是已停藥數日重新接受療程時必須瞭解的情況：橫臥突然爬起會有頭暈、頭昏、或昏倒的狀況。避免發生危險，您應慢慢下床，於床邊休息一會再緩緩站起。症狀沒改善請告訴醫師。
- 7、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
睏倦；難以睡著或清醒；虛弱；背痛；腹瀉；鼻塞流鼻水；臉部疼痛或有壓力；喉嚨疼痛、咳嗽、發燒、冷顫或其它感冒的症狀；視線模糊；射精困難。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
持續勃起，疼痛數小時；紅疹；發癢；蕁麻疹；身體局部腫脹。	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：頭暈、昏倒、視線模糊、反胃、頭疼。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。假如您中斷數日或一段時間，請告知醫師給予重新療程，特別當您每日服藥量已超過一顆膠囊時。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)