

## Ufur 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Ufur 友復 膠囊	Tegafur / Uracil	100 mg/cap; 224 mg/cap

### 【作用】

胃癌、大腸癌、乳癌、結腸癌、頭頸部鱗狀上皮癌、與 Cisplatin 併用治療轉移及末期肺癌。

### 【用法和用量】

- 1、請依照醫師指示按時服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 2、若合併其它藥物治療時，請確定每種藥品之服用時間，勿任意合用。
- 3、如果服藥不久後便吐出來，請告知醫師，確認是否補服此次劑量。

### 【注意事項】

1. 本藥使您的抗菌力降低，應避免與有傳染病的人接觸，有任何感染症狀如發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛等，請立即就醫。
2. 如果您曾經對此藥有過敏反應，請告知醫師。勿哺乳。需避孕。
3. 服用本藥期間，勿使用避孕丸。若懷疑受孕藥馬上告知醫師。
4. 請事先告知醫師您目前使用的所有藥品，以及曾經做過之任何治療。
5. 治療前若有任何疾病（例如肝、腎病等），請告知醫師。
6. 請定期回診以確定療效並追蹤病情及做檢驗。
7. 服用此藥時，除非您的主治醫師指示，否則不可打預防針、疫苗；與您親近的人（例如家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。
8. 請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮及手），避免刀傷（例如刮鬍刀、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。
9. 如需看其他醫師，請主動告訴醫師您目前所使用的藥品。
10. 該藥會引起噁心、嘔吐，醫師可能會開預防用藥，如果藥物無效請告訴醫生。
11. 使用此藥請勿同時併用抗病毒劑 sorivudine。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
失去食慾、胃痛、掉髮、膚色變黑等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
發燒、發冷、喉嚨痛、口腔及唇部潰瘍、異常出血或瘀血、黑便、血尿、嚴重腹瀉、腹痛、嘔吐、皮膚出現針狀紅點、嚴重發疹、頭昏厭食、倦怠等。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教慈善醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)