

Lamisil 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Lamisil 療徽舒 錠	Terbinafine	250 mg/tab	白色圓扁形錠劑 S/T 字樣

【作用】

抗黴菌劑。

【用法和用量】

- 1、每日使用 1 次，手指甲需持續 6 週的療程，腳指甲則需 12 週。
- 2、請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、開始的幾個月內或許無法完全的治癒，直到健康的指甲完全長出來為止。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如有對藥物過敏或服用以下其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：
cimetidine、rifampin、selegiline、beta-blockers、抗凝血劑、抗憂鬱劑、免疫系統抑制療程。
- 4、若您曾患腎臟或肝臟方面疾病、HIV 或 AIDS，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
腹瀉；反胃；胃痛；紅疹；發癢；蕁麻疹；味覺改變或損失。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
持續性的反胃；胃口損失；異常疲倦；嘔吐；胃的右上部感到痛苦；黑尿；淺色的糞便；持續且嚴重的皮疹；發燒、喉嚨疼痛或其它感染的症狀。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。



財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)