

Xanthium 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Xanthium 善寧 持續性藥效膠囊	Theophylline	200mg/cap
Centertheo 適優喘 液	Theophylline	5.34mg/cc 60cc/bot

【作用】

解除氣喘發作的支氣管平滑肌痙攣，使呼吸道順暢。

【用法和用量】

1. 通常每日二至三次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳，或有消化性潰瘍、甲狀腺機能亢進、高血壓、腎臟病、肝臟病或心血管疾病，請告知您的醫師。
2. 喝茶、咖啡、可樂，及抽煙會影響茶鹼的作用，當使用習慣改變時，請告知您的醫師。
3. 若您對 Theophylline 或其他藥物過敏，請告知您的醫師。
4. 同時服用感冒的成藥時，如果其內含有麻黃素，請告知您的醫師。
5. 服用此藥時，應該主動告知您的醫師所有您同時服用的其他藥品。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情形：

症 狀	如何處理
如果您有噁心、嘔吐、胃痛、腹痛的症狀，可以將藥物改為隨餐服用、飯後馬上服用或配合制酸劑服用	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
如果您有頭痛、暈眩、頻尿、肌肉抽痛、失眠、心律不整、呼吸急促等，症狀嚴重且持續時	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)