

## Eltroxin 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Eltroxin 昂特欣錠	Thyroxin Na	100 mg/tab

### 【作用】

甲狀腺機能減退症

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、一天服用一次，每天固定時間服用。通常早餐前服用。
- 3、不可與其他藥物如：制酸劑、鐵劑、cholestyramine、Sucralfate、simethicone 併服。最好隔 4 小時以上。

### 【注意事項】

- 1、甲狀腺功能正常者不應用它來治療肥胖。因為甲狀腺功能正常者本品無法使其體重減輕，反而可能引起嚴重或威脅生命的毒性，尤其併服安非他命類藥品。
- 2、本品只能幫忙控制甲狀腺功能低下症狀，無法治癒。服藥要超過幾星期才能改善症狀。即使感覺症狀改善後仍要繼續服藥，不要擅自停藥。
- 3、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、肝腎疾病、心臟病、服用其他藥物，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
體重減輕、部份身體無法控制的震動、頭疼、噁心、嘔吐、腹瀉、胃痙攣、焦慮、激躁、活動過度、很難入睡、食慾增加、熱潮紅、月經週期改變、肌肉無力、暫時性掉髮，尤其治療第一個月的小孩	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹、呼吸或吞嚥困難、胸痛、快速或不規則心跳、手、腳、腳踝、下腿腫脹、盜汗、對熱敏感或無耐受性、神經質、發作	請停藥，並立即就醫


### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。如果您忘了服藥 2 次或 2 次以上，請告訴醫師。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)