

Livial 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Livial 利飛亞 錠	Tibolone	2.5 mg/tab

【作用】

自然或手術後停經引起之症狀（如潮紅、發汗、心情、抑鬱、性慾降低）本品屬於選擇性組織雌激素的活性調節劑（Selective Tissue Estrogenic Activity regulator），具有雌激素、黃體素、及微弱雄性激素活性，不會刺激子宮內膜，可穩定因卵巢喪失功能後更年期間下視丘腦下垂體系統。

【用法和用量】

通常成人每次 1 錠，一天 1 次，配水或其他飲料吞服，最好每天同一時間服用。通常在數星期內症狀即可緩解，但應持續使用至少 3 個月，才能獲得最佳療效。預防骨質疏鬆須長期服用。

【注意事項】

- 1、如果您對該藥過敏，請告訴醫師或藥師。
- 2、自然停經的婦女應在最後一次停經後至少 12 個月後才開始以本品治療。
- 3、有子宮的婦女由僅含雌激素治療轉換成本品時，應先服用黃體素來誘導出血。若由週期型藥品轉換成本品時，應在出血結束後（通常是月經來後第 5 天）馬上開始以本品治療。若由連續複合式藥品轉換成本品時，可在任何時候開始治療。
- 4、如果您在服用抗凝血劑 Warfarin，請告訴醫師，可能需改變劑量或監測副作用。
- 5、打算懷孕、已懷孕、哺乳、曾患有癌症、非預期的陰道出血、凝血疾病、肝臟疾病，請告訴醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
陰道出血、白帶、腹部疼痛、體重增加、乳房疼痛、毛髮增多、外陰部搔癢、外陰部念珠菌感染、陰道炎、健忘。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
急性過量可能造成噁心、嘔吐、陰道出血。	無特殊解毒劑，症狀治療

【忘了服藥怎麼辦？】

在錯過時間未超過 12 小時前，應在想起後儘快補服，如果超過 12 小時，跳過一次，不要補服，並在正常時間服用下一劑。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)