Brilinta 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Brilinta 百無凝膜衣錠	Ticagrelor	90 mg/tab

【作用】

防止血栓形成，以降低中風、心臟病發作、或對接受經皮冠狀動脈介入治療者，減少支架栓塞的發生。

【用法和用量】

1. 通常每日二次，飯前或飯後皆可，請固定時間服用。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有肝臟、血液方面、出血性潰瘍等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症　　狀	如何處理
腹瀉、噁心、頭痛、眩暈等	將情況告訴醫生
不尋常出血(例如瘀傷、血腫、流鼻血、血尿、胃腸道出血)、喉嚨痛、發燒、皮膚發疹等	立即通知醫生

【忘了服藥怎麼辦？】

不要補吃，回歸原正常時間服用，千萬不要使用雙倍的劑量或額外的劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102（例假日及晚上）