

Topamax 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Topamax 妥泰 膜衣錠	Topiramate	25mg/tab

【作用】

成人及 ≥ 2 歲兒童局部癲癇；預防偏頭痛。

【用法和用量】

1. 通常一日二次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服用此藥有時會引起頭暈，避免開車或操作危險機器，飲酒會加重副作用。
2. 喝充份的水可減少腎結石形成的危險性。
3. 如果您有或曾經有腎及肝臟、腎結石等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、疲倦、頭痛、視力模糊、嗜睡、手指尖、腳指尖感覺刺痛、運動協調困難、走路不穩等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮膚發疹、搔癢、呼吸困難、發燒、心律不整、癲癇等。	立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)