

## Utraphen/Ultracet 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Utraphen 立除痛膜衣錠	Tramadol/Acetaminophen	37.5mg/325mg
Ultracet 及通安錠		

### 【作用】

止痛劑。

### 【用法和用量】

1. 通常每 4-6 小時服用一次，每次 1~2 錠。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。
3. 服用本藥期間，請勿飲用酒精性飲料。

### 【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是鴉片類止痛劑、抗憂鬱藥、MAO 抑制劑、中樞神經抑制劑、抗痙攣劑(如 carbamazepine)、warfarin、erythromycin、ketoconazole、linezolid、digoxin、lithium、rifampin、抗心律不整藥(quinidine 類)，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
2. 如果您有或曾經有腎臟、肝臟功能不全的情形、腦部受傷、癲癇、酒精中毒、或藥物濫用，應告知您的醫師。
3. 您計畫懷孕或可能懷孕或哺乳，請先告知您的醫師。
4. 可能會引起思睡及注意力下降，故服藥期間，如果從事需要注意力的工作，如：操作機械、開車...等，須特別小心。
5. 此藥可能會造成昏眩，由坐位或平躺姿勢起身時要緩慢小心。

### 【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有下列情形：

症 狀	如何處理
噁心、嘔吐、沒有胃口、心悸、輕微頭痛、緊張感、輕微皮疹、便秘等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮膚出現搔癢或紅疹、呼吸困難、皮膚紅疹、心跳過速、頭昏、暈眩、癲癇、暗色尿、不尋常的嗜睡、皮膚濕冷。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)