

Switane 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Switane 瑞丹錠	Trihexyphenidyl	2 mg/tab

【作用】

肌肉僵直、痙攣。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量，突然停藥可能會導致帕金森氏症復發。
- 2、每日使用 3 至 4 次（三餐加睡前）。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、您若有對特定藥物過敏或用此藥同時有服用下列其他藥物，請告訴醫師：
Amantadine；Digoxin；Haloperidol；Levodopa；Tranquilizers；Vitamins。
- 3、開刀前(包括牙齒)請告訴醫師您在服用此藥。
- 4、若您曾患有胃、腎臟或肝臟病、重症肌無力症、心臟或血壓疾病、泌尿系統或攝護腺問題，請告訴醫師。
- 5、此藥可能會使你疲倦，操作具危險性機械包括開車應小心。
- 6、酒精飲料會增加藥物暈倦的副作用。
- 7、服用此藥時可能會有反胃的感覺，可與食物或牛奶一併使用以減少這個症狀。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
睡意；頭暈或視線模糊；口乾；反胃；嘔吐；腹瀉；便秘；增加眼睛對光的敏感；小便困難。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮疹；心跳快速、沉重或心律不整；發燒；混亂；沮喪；錯覺或幻覺；眼睛痛。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。