

Valtrex 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Valtrex 祛疹易錠	Valaciclovir	500 mg/tab

【作用】

帶狀疱疹、復發性生殖器疱疹的預防及治療。

【用法和用量】

- 1、用於治療帶狀疱疹，每八小時服用一次，每日三次，療程約一星期；而治療生殖器疱疹每日兩次，療程約五天。
- 2、請遵照醫師指示服用，不可私自停藥增減藥量。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：
Tagamet；Benemid；Vitamins。
- 3、若您曾患有腎臟或肝臟方面的疾病、HIV、愛滋病或免疫系統的問題，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；反胃；嘔吐；腹瀉；便秘。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；發癢；困惑；皮膚或眼睛泛黃；發燒；血尿。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)