

Depakine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Depakine 帝拔癲 腸溶錠	Valproate Sodium	200 mg/tab
Depakine-Chrono 帝拔癲 持續藥效 膜衣錠	Valproate Sodium 333mg Valproic Acid 145 mg	500mg/SR-FCT
Depakine(水劑) 帝拔癲 液劑	Valproate Sodium 200mg/ml	40ml/bot

【作用】

抗痙攣用藥。

【用法和用量】

1. 通常一日二至三次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 持續藥效錠請勿咀嚼且不可磨粉，但可以剝半。
2. 請用隨瓶附贈的量管量取藥液，以白開水稀釋後服用。
3. 本品會造成尿酮檢驗結果誤判，糖尿病檢查時宜謹慎。
4. 服用本品患者宜事前先檢查肝功能，之後還得定期檢查。
5. 孩童服用 valproic acid 時，請觀察並記錄其行為、情緒及癲癇發作情形。
6. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、腸胃不適、消化不良、嗜睡等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮膚發疹、皮膚腫脹、易瘀血(皮膚上有紫色小斑點)、流鼻血、皮膚及眼睛發黃、茶色尿、發燒、喉嚨痛等。	立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)