

## Diovan 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Diovan 得安穩 膜衣錠	Valsartan	160 mg/fct

### 【作用】

高血壓、心衰竭。心肌梗塞後左心室功能異常。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、用於高血壓時，一天服用一次，每天固定時間服用。
- 3、用於心臟衰竭時，一天服用兩次，每天固定時間服用。
- 4、可與食物服用或單獨不和食物併服。

### 【注意事項】

- 1、懷孕時不可使用此藥，使用期間準備懷孕立即通知醫師，此藥會對嬰兒造成危害。
- 2、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前，請勿擅自停藥。
- 3、服用本藥前，如有服用其他藥物（利尿劑、其他 ACE I、 $\beta$ -阻斷劑）或曾患其他疾病（肝、腎疾病）或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 4、患者若曾有肝、腎方面的疾病，請告知醫師。
- 5、醫師可能會交代低鈉(低鹽)飲食計劃，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈、頭疼、異常疲倦、腹瀉、胃痛、背部疼痛、關節痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
身體局部性腫脹。嘶啞。呼吸或吞嚥困難。昏倒。	請立即就醫
藥物過量之副作用：頭暈、昏倒、心跳激烈或加速。	請急診

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)