

Isomil 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Isomil 依索蜜糖衣錠	Verapamil	40 mg/sct

【作用】

降血壓、狹心症、心律不整。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日使用 3 次。

【注意事項】

- 1、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或其準備、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、患者如果有心臟、腎、肝臟方面的疾病；肌肉營養失調或腸道阻塞，請告知醫師。
- 4、服用此藥可能會引起胃痛，可與食物或牛奶併服。
- 5、用藥期間不可飲用含酒精的飲品。
- 6、您的醫生可能會交代低鈉(少鹽)高鉀的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
便秘；頭暈或頭昏；頭疼；反胃；胃灼熱；異常疲倦；臉潮紅；心跳緩慢；逼真、異常的幻想。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
身體局部腫脹；呼吸或吞嚥困難；昏倒；紅疹；皮膚或眼睛泛黃；發燒；心絞痛的頻率或嚴重性增加。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)