

## Mafarin 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Mafarin 脈化寧 錠	Warfarin	2.5 mg/tap

### 【作用】

預防血栓

### 【用法和用量】

- 1、遵照醫師指示服用。(可空腹或與食物一起服用)
- 2、不可自行增減藥量、更改用法或停藥。

### 【注意事項】

1. 此藥易與其他藥物有交互作用，請務必與醫師或藥師充分討論後再服用。
2. 服藥期間定期回診，並視情況作血液學檢查。
3. 服藥時，請勿與含酒精的飲料併服。
4. 服藥期間避免從事危險或易受傷的運動。
5. 請維持規則的飲食習慣(包括不要自行服用其他營養補充品或維生素)，請勿不規則食用大量蔬菜和飲用綠茶。
6. 服用本藥，應同時採取有效的避孕措施，若疑有懷孕應立即與醫師聯絡。
7. 若您為懷孕後期或剛生產後，請告訴醫生。
8. 接受任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在服用本藥，並詢問是否需停藥。

### 【可以和其他藥物一起使用嗎？】

1. 服用前，請務必告知醫師您正在服用的藥品（包括非處方藥、健康食品、中草藥、疫苗與常見止痛退燒藥）。服藥期間定期回診，並視情況作血液學檢查。
2. 當長期在服用 WARFARIN（脈化寧），如果因其它疾病需就醫時，請主動告知醫師您正在服用此藥。

### 【目前懷孕了或正在哺乳，可以繼續使用嗎？】

1. WARFARIN（脈化寧）不可以使用於懷孕的婦女，因為可能導致流產、生殖缺陷或胎兒死亡。若於服藥期間懷孕，也請立刻告知醫師，共同討論其生育計畫。
2. 美國藥物食品管理局訂定之懷孕用藥安全級數為 X 級（對胎兒的危險性遠大於其療效，禁用於孕婦）。
3. WARFARIN（脈化寧）會分泌至乳汁，授乳婦女應小心謹慎。

### 【可能出現的副作用】

	症 狀	如何處理
罕見	畏寒，無食慾，胃絞痛	可於回診時告訴醫師，但症狀嚴重或是持續時，請先與醫師或是藥師聯絡。
少見	咳嗽或聲音嘶啞，下背部或側腰疼痛，皮膚紅疹或蕁麻疹、皮膚癢，排尿困難或疼痛。	儘快與醫師或是藥師聯絡
罕見	眼睛或皮膚變黃，呼吸困難，臉及下肢浮腫，皮膚起水泡或腫痛(特別是在腿、乳房、陰莖或臀)，腳趾疼痛或變藍紫色，尿量異常。	
	甲、 身體出現任何異常出血或淤青、傷口不易止血 乙、 疑似感染症狀:發燒、寒顫、口腔內出現白點或潰瘍 丙、 持續數天無法進食、胃部不適、腹瀉	立即與醫師或是藥師聯絡。

### 【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。
3. 連續兩天以上(含兩天)忘了服藥，請立即與醫師聯絡。醫師將視情況再為您調整藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)