

## 鼻噴劑使用須知

商品名	主要成分名	劑量/劑型
Avamys Nasal Spray 艾敏釋鼻用噴液懸浮劑	Fluticasone furoate	27.5mcg/50ul/dose, 120 次/瓶
Nasonex 內舒拿鼻噴劑	Mometasone furoate	50 ug/次 140 dose/瓶

### ◆我該如何正確使用鼻噴劑？

- 1.請依醫師指示使用，不要使用過量或超過醫師指定的次數，以免增加副作用的發生機率。
- 2.使用前請先清潔鼻腔，用拇指壓住一邊鼻孔，將噴嘴插入另一邊鼻孔，頭稍向前傾，噴霧器保持垂直。
- 3.用手按壓噴嘴，用鼻吸入噴出之氣霧，再用口呼氣。
- 4.換手並在另一邊鼻孔重複整個程序。
- 5.即使自覺病情有改善，未與醫師諮商前，請勿隨意停藥。
- 6.請置於乾燥陰涼處及兒童不能接觸的地方。

### ◆如果忘記使用藥品怎麼辦？

想起時請盡快使用，但如果想起時已經接近下一次使用藥品的時間，就跳過這一個不使用，在下一個使用藥品的時間準時用藥，但請不要使用兩倍的藥量。

### ◆使用這個藥品有可能會出現哪些副作用？

可能出現鼻子與喉嚨之乾燥與刺激感，不適的味覺與氣味，若有過敏症狀（如眼睛發癢流淚）請告知醫師。

### ◆我該如何儲存這個藥品？

儲存於室溫陰涼、乾燥處，避免陽光直接照射。並請存放於兒童接觸不到的地方。

### ◆懷孕或哺乳時，可以繼續使用嗎？

請教醫師或藥師該藥對孕婦或授乳婦之安全性。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)